



Gastroenterologie

Allgemeine Innere Medizin

Dr. med. Wulf Winkler

Spitalstrasse 38

4226 Breitenbach

Anleitung zur Darmvorbereitung mit Moviprep®

Liebe Patientin, Lieber Patient

Für die Darmspiegelung (Koloskopie) ist es wichtig, dass Ihr Darm vollständig entleert und sauber ist.

Essen vor der Untersuchung

Drei Tage vor der Untersuchung stellen Sie Ihre Ernährung um (möglichst keine Ballaststoffe/Kerne):

- Verzichten Sie auf Obst, Beeren, Salat, Gemüse, Pilze, Vollkornprodukte, Nüsse, Samen
- Essen Sie Reis, Pasta, geschälte Kartoffeln, Weissbrot, Honig, Käse, Fleisch, Fisch, Eier etc.

Fasten Sie nicht vor der Einnahme von Moviprep®. Ab Beginn der Einnahme von Moviprep® (Portion 1) bis nach der Untersuchung nichts mehr essen. Bis 3 Stunden vor der Untersuchung zusätzlich Getränke einnehmen, um einen Flüssigkeitsverlust zu vermeiden.

Keine Tabletten am Untersuchungstag

Keine Tabletten am Untersuchungstag einnehmen. Falls Sie Medikamente zur Blutverdünnung oder Medikamente gegen hohen Blutzucker nehmen, besprechen Sie dies bitte mit uns oder Ihrem Hausarzt. Falls Sie inhalieren (z.B. bei Asthma oder COPD), tun Sie das weiter wie gewohnt.

Zubereitung und Einnahme von Moviprep®

- **Portion 1:** 1 Beutel „A“ und „B“ zusammen in 1 Liter kaltem Wasser auflösen. Zusätzlich ½ Liter klare Flüssigkeit (Wasser, Tee, Bouillon, Kaffee ohne Milch, Sirup, Softdrinks) bereitstellen. Das zubereitete Medikament und den ½ Liter klare Flüssigkeit abwechselnd glasweise (1 Glas Moviprep®/1 Glas Wasser) innert 90 Min. trinken.
- **Portion 2:** 1 Beutel „A“ und „B“ zusammen in 1 Liter kaltem Wasser auflösen. . Zusätzlich ½ Liter klare Flüssigkeit (Wasser, Tee, Bouillon, Kaffee ohne Milch, Sirup, Softdrinks) bereitstellen. Das zubereitete Medikament und den ½ Liter klare Flüssigkeit abwechselnd glasweise (1 Glas Moviprep®/1 Glas Wasser) innert 90 Min. trinken.
- **Ganz wichtig:** 3 Stunden vor Ihrem Termin NICHTS mehr trinken!

Nach Einnahme der 1. Portion tritt nach 1-3 Stunden Durchfall von 2-6 Stunden Dauer ein. Während und nach der Einnahme von Moviprep®: Gehen Sie umher (nicht hinlegen). Gegen Reizung des Anus: Fettende oder zinkhaltige Salbe auftragen. Bei Übelkeit: 1 Tablette Motilium® (Domperidon) einnehmen. Falls bei Einnahme von Portion 1 am Vorabend auch nach 3-4 Stunden keine Stuhlentleerung eintritt, trinken Sie am gleichen Abend Portion 2.

Aufteilung der Einnahme gemäss Uhrzeit Ihres Koloskopie-termins



PRAXIS

DR. WINKLER

Gastroenterologie

Allgemeine Innere Medizin

Dr. med. Wulf Winkler

Spitalstrasse 38

4226 Breitenbach

Aufteilung	Termin zwischen 08.00 – 09.10 Uhr	Termin zwischen 09.20 – 11.10 Uhr	Termin zwischen 11.20 – 13.40 Uhr	Termin zwischen 13.50 – 16.30 Uhr
Portion 1	Vorabend 19.00 – 20.30 Uhr	Vorabend 19.00 – 20.30 Uhr	Vorabend 19.00 – 20.30 Uhr	Untersuchungstag 07.00 – 08.30 Uhr
Portion 2	Untersuchungstag 03.30 – 05.00 Uhr	Untersuchungstag 04.50 – 06.20 Uhr	Untersuchungstag 06.50 – 08.20 Uhr	Untersuchungstag 09.20 – 10.50 Uhr